

Cancro inflamatório da mama

O cancro inflamatório da mama é um tipo de cancro, muitas vezes mal compreendido e confundido com um processo inflamatório, como a mastite ou como uma dermatite. Um diagnóstico não ajustado à realidade, atrasa o tratamento e conduz a um prognóstico com menos expectativas de cura. Como sabemos, o diagnóstico precoce do cancro salva vidas! Daí a necessidade de nós mulheres estarmos bem informadas e alerta para estas situações.

O cancro inflamatório da mama, surge habitualmente em mulheres com idade média entre os 45 e 55 anos.

A mulher pode apresentar aumento da mama, calor, aumento da sensibilidade e eritema (pele de coloração avermelhada), associado ou não a edema (inchaço) da pele. Este edema resulta normalmente numa pele com aspecto de “casca de laranja” .

O nódulo na mama e/ou na axila do mesmo lado (adenopatias dos gânglios linfáticos) podem ou não ser observáveis. Haagensen verificou a existência dessa massa palpável apenas em 57% das suas doentes, enquanto que uma percentagem equivalente evidenciava eritema da mama.

O diagnóstico desta doença, passa por uma mamografia e uma biopsia da pele afectada, para estudo do tipo de células envolvido e consequente confirmação da presença de células cancerígenas.

Esteja atenta para as alterações que possa perceber no seu corpo!